



Thông tin cần biết	Có	Không
<p>1. Triệu chứng:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sơ sinh và trẻ < 2 tuổi: ❖ li bì hoặc bú rớt ❖ bú kém hoặc bỏ bú ❖ ọc sữa ❖ tiêu chảy ➤ Trẻ > 2 tuổi: ❖ đau bụng ❖ đau lưng ❖ tiểu gắt, tiểu lắt nhắt ❖ tiểu máu ➤ Sốt ➤ Hẹp da quy đầu ➤ Đính môi nhỏ <p>2. Xét nghiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Xét nghiệm máu ❖ Xét nghiệm nước tiểu ❖ Soi cấy nước tiểu ❖ Siêu âm bụng ❖ Chụp CTS ❖ Các xét nghiệm khác <p>3. Theo dõi và điều trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kháng sinh đường uống 5 ngày ✓ Đối với trường hợp nặng, chích kháng sinh 10-14 ngày ✓ Hạ sốt ✓ Uống nhiều nước ✓ Điều trị hỗ trợ : truyền dịch ✓ Theo dõi sát các dấu hiệu nặng ✓ Xét nghiệm máu và nước tiểu sau 48-72h ✓ Phẫu thuật sau khi điều trị nhiễm trùng nếu có chỉ định 		

