



VIÊM AMYDAN CẤP

| | Có | Không |
|---|----|-------|
| Triệu chứng: <ul style="list-style-type: none">- Sốt 39-40⁰C- Đau họng, khi nuốt sẽ đau lên lỗ tai- Hôi miệng- Khó thở- Ăn buồn nôn- Sờ đau hạch vùng cổ 2 bên- Chán ăn. | | |
| Chẩn đoán: <p><i>Khám lâm sàng</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Amydan sung huyết- Amydan có mũ- Amydan có giả mạc <p><i>Cận lâm sàng:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Công thức máu- Phết amydan, cấy mũ amydan | | |

Điều trị:

- Kháng sinh, kháng viêm, giảm đau, hạ sốt.
- Vệ sinh răng miệng.
- Lối sống lành mạnh (Hạn chế rượu, bia, thuốc lá, thức ăn chua, cay, nóng, nhiều dầu mỡ).

Chỉ định cắt amydan:

- Một năm > 4 đợt viêm amydan cấp
- Hôi miệng do amydan hốc mủ
- Đã từng bị biến chứng do viêm amydan (Áp xe thành sau họng, áp xe quanh amydan)
- Amydan phì đại gây ngủ ngáy to, ngừng thở khi ngủ, nuốt vướng.

*Chỉ cắt amydan khi đã điều trị ổn định đợt cấp viêm amydan

